

МУРАВЬЁВ НЕТ

Гранулированный биологический комплекс-приманка для снижения популяций и профилактики появления и распространения различных видов муравьев.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Предназначен для профилактики появления и распространения чёрных, рыжих садовых и домашних муравьёв.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Размещение (раскладка) в местах массового скопления и передвижения вредителей.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Против домашних муравьёв: норма расхода 100 г препарата на 100 кв. метра.

Против садовых черных и рыжих муравьёв: норма расхода 20-40 г препарата на 1 муравейник/колонию муравьёв.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Муравьи питаются препаратом-приманкой и большую часть переносят в муравейники, распространяя ее на всю колонию. Гибель муравьев следует ожидать в течение нескольких дней после применения препарата.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокое инсектицидное действие против садовых и домашних муравьев.

Пролонгированное длительное последствие, которое проявляется в гибели вредителей в следующие фазы развития и в период развития последующих поколений.

Препарат безопасен для теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и человека, отсутствует риск накопления токсичных веществ в окружающей среде.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат-приманку нужно рассыпать в местах массового скопления и передвижения муравьев (жилые помещения,

PLANTECO

для защиты растений
от широкого спектра
грибных
бактериальных
болезней

МУРАВЬЁВ НЕТ



СОСТАВ

Борная кислота, пищевой аттрактант (от лат. «attractio» притягиваю к себе) *Saccharomyces cerevisiae*, инертный наполнитель..



ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Нерастворимый, гранулы



УПАКОВКА

Пакет «дой пак» с замком «зип-лок» – 1 кг
Бумажный трехслойный мешок с ПЭТ вкладышем – 5 кг, 20 кг



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить при t° от -10°C до +25°C в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в недоступных для детей и животных местах.

Допускается кратковременное хранение или транспортировка при температуре от -25°C до +35°C.

Хранить отдельно от пищевых продуктов, в местах недоступные для детей и домашних животных. Во время применения соблюдать правила личной гигиены, не употреблять пищу, не пить, не курить. После применения препарата вымыть руки и лицо с мылом.

террасы, щели брусчатки и тротуарных плит, тропы, подъезды жилых домов, складские и производственные помещения, приусадебные участки, пр.).

Обработку следует проводить после 21:00. Полное уничтожение колонии может занять от 5 до 7 дней, в зависимости от конкретных условий и численности колоний. При необходимости применить препарат повторно через 10-15 дней.

В случае высокой вероятности осадков в течение 24 часов после применения препарат внесение препарата необходимо отсрочить.