

СЛИЗНЯКОВ НЕТ

PLANTECO

Гранулированный биологический комплекс-приманка

Для профилактики появления слизней и улиток



Состав

1% фосфата железа, 2% - пищевой аттрактант *Saccharomyces cerevisiae*, 97% - наполнитель-приманка растительного происхождения.



Упаковка

80 г, 400 г.



Условия хранения

Хранить препарат в герметичной упаковке, в сухом и защищенном от света месте при температуре от минус 5 °С до +25 °С.



Срок хранения

24 месяца от даты изготовления.

СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ

Равномерно рассыпать в местах размножения и перемещения слизней и улиток

НОРМА РАСХОДА

80 г/1 сотку

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Препарат обладает контактно-кишечным действием. Контактное действие препарата проявляется вскоре после контакта поверхности тела моллюсков с препаратом, вызывает ожоги тела и гибель вредителей. Кишечное - после поедания гранулы препарата слизнями и улитками, что впоследствии вызывает остановку пищеварения. Гранулы содержат вещества с привлекательным для моллюсков запахом и вкусом, ускоряет поедания их моллюсками.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Препарат равномерно рассыпают в местах передвижения и размножения слизней.
- В случае использования на грядках, клумбах и т.д. - вносить в строки, не ближе 20 см к растению.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

- Гранулированный препарат-приманка предназначен для борьбы с улитками и слизнями. Действие препарата проявляется вскоре после поедания гранулы слизнями и контакта поверхности тела моллюсков с препаратом, впоследствии вызывает их гибель.
- Для использования на приусадебных участках, спортивных зонах, в производственных, санитарно-бытовых, хозяйственных постройках (помещениях) и других объектах, в местах массового отдыха, в подвалах, подсобных помещениях и в местах расположения пожарных емкостей и мусорных контейнеров, во всех местах развития и размножения моллюсков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА

- Высокая эффективность против слизней.
- Максимально контролирует моллюсков в местах передвижения и предотвращает их размножение.
- Первые признаки действия препарата наблюдаются с первых часов внесения, массовая гибель наступает на 3-6 сутки.
- Препарат-приманка привлекательна для слизней даже при наличии корма.
- Низкая токсичность для нецелевого объектов: дождевых червей, пчел, полезных насекомых.

ХРАНЕНИЕ

Хранить отдельно от пищевых продуктов, в местах недоступных для детей и домашних животных! При применении соблюдать правила личной гигиены, не употреблять пищу, не пить, не курить. После применения препарата вымыть руки и лицо с мылом.