



СЛИЗНЯКОВ НЕТ

PLANTECO

ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ГРИБНЫХ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ

СЛИЗНЯКОВНЕТ

Гранулированный биологический комплекс-приманка для снижения популяций брюхоногих моллюсков и профилактики появления и распространения слизней и улиток.



СОСТАВ

Гранулированный биологический комплекс-приманка для снижения популяций брюхоногих моллюсков и профилактики появления и распространения слизней и улиток.



ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Нерастворимый, гранулы



УПАКОВКА

Пакет «дой пак» с замком «зип-лок» – 1 кг
Бумажный трехслойный мешок с ПЭТ вкладышем – 5 кг, 20 кг



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить при t° от -10°C до +25°C в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в недоступных для детей и животных местах.

Допускается кратковременное хранение или транспортировка при температуре от -25°C до +35°C.

Хранить отдельно от пищевых продуктов, в местах недоступных для детей и домашних животных. Во время применения соблюдать правила личной гигиены, не употреблять пищу, не пить, не курить. После применения препарата вымыть руки и лицо с мылом.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Препарат обладает контактно-кишечным действием.

Контактное действие препарата проявляется вскоре после контакта поверхности тела моллюсков с препаратом, вызывает ожоги тела и гибель вредителей.

Кишечное действие проявляется после поедания гранулы препарата слизнями и улитками, что впоследствии вызывает остановку пищеварения. Гранулы содержат вещества с привлекательным для моллюсков запахом и вкусом, ускоряет поедания их моллюсками.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая эффективность против слизней и улиток.

Максимально контролирует моллюсков в местах передвижения и предотвращает их размножение.

Первые признаки действия препарата наблюдаются с первых часов внесения, **массовая гибель наступает на 3-6 сутки.**

Препарат-приманка **привлекательна для слизней даже при наличии корма.**

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Предназначен для профилактики появления и распространения слизней и улиток.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Размещение (раскладка) в местах массового скопления и передвижения вредителей.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ внесения	Норма расхода
Внесение в местах массового скопления	8-10 кг/га
Равномерное распределение препарата в местах скопления, размножения и передвижения	80-100 г/сотку

Норма применения может зависеть от количества вредителей и интенсивности поедания приманки слизнями и улитками.

Низкая токсичность для нецелевого объектов: дождевых червей, пчел, полезных насекомых.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат равномерно рассыпают в местах активного передвижения и массового размножения слизней.

Возможно использование на приусадебных участках, в спортивных зонах, в производственных, санитарно-бытовых, хозяйственных постройках (помещениях) и других объектах, в местах массового отдыха, в подвалах, подсобных помещениях и в местах расположения различных емкостей и мусорных контейнеров, во всех местах развития и размножения моллюсков.

В случае использования на грядках, клумбах и т.д. рекомендовано вносить препарат в рядки, не ближе 15-20 см к -растениям.

Для пролонгации действия и эффективной работы препарата необходимо сохранить гранулы от намокания (дождь, роса). В случае намокания гранулы необходимо заменить.